

PUNTOS IMPORTANTES PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES II

Para la Prevención de la vía central asociada a infecciones del torrente sanguíneo

- Eliminar catéteres innecesarios
- Utilizar las prácticas adecuadas de inserción y facilitar las prácticas adecuadas de inserción
- Cumplir con las recomendaciones de higiene de las manos
- Usar preferentemente Gluconato de Clorhexidina para la antisepsia de la piel
- Elegir sitios de punción como vena subclavia, yugular anterior. Eliminar el sitio femoral para la colocación de accesos vasculares centrales
- Realizar adecuada desinfección de los conectores, llaves de tres vías (antes de retirar la rosca) y todo ingreso al sistema
- Proporcionar educación continua al personal de enfermería y médicos sobre el mantenimiento e inserción de la vía central

También tener en cuenta:

- Baño con G. Clorhexidina
- Catéteres impregnados en antimicrobianos
- Esponjas impregnadas en G. Clorhexidina

Para prevenir las infecciones de Clostridium difficile (CD)

- Las precauciones de contacto durante la duración de la diarrea
- Cumplir con las recomendaciones de higiene de las manos
- Realizar Adecuada limpieza y desinfección de equipos y el medio ambiente
- Contar con un sistema de alerta basado en el laboratorio la notificación inmediata de los resultados positivos
- Educar acerca de CD: personal profesional, limpieza, administración, pacientes, familiares

También tener en cuenta:

- Ampliar el uso de precauciones de contacto más allá de la duración de la diarrea (por ejemplo, 48 horas)
- Aislamiento presuntivos de los pacientes sintomáticos en espera de la confirmación de CD
- Evaluar y optimizar pruebas de laboratorio de CD
- Aplicar agua y jabón para la higiene de manos antes de salir de la habitación de un paciente con CD
- Implementar el uso de guantes universal en las unidades con altas tasas de CD



Grupo Asesor
Control de Infecciones
y Epidemiología

- Utilizar desinfectantes registrados por la EPA con la afirmación de esporicida (por ejemplo, clorados) u otros aprobados para la desinfección del medio ambiente
- Implementar un programa de control de antimicrobianos

Fuente: Centers for Disease Control
and Prevention: año 2011